

# GRAPHITES

O doente *Graphites* é apático, tímido, inquieto, hesitante. Chora sem motivo. A música faz com que chore.

Desencorajado, pensa continuamente na morte.

É excessivamente prudente, tem o desejo da perfeição.

Friorento, triste, indeciso, impressionável, com a sensibilidade à flor da pele. É indiferente e a sua memória está afectada. Tem dificuldade em tomar decisões.

Nenhum trabalho o satisfaz, qualquer actividade causa-lhe desagrado. Não consegue estar quieto, principalmente quando está sentado no trabalho.

Estado de catalepsia: o paciente está consciente mas não pode mexer-se nem falar.

As crianças são traquinas e imprudentes. Riem e zombam quando as reprimimos.

É um medicamento que tem maior aplicação nas mulheres. Hipersensibilidade. É uma pessoa muito sensível. Chora nos filmes tristes. Chora sem motivo. Apática. Inquieta. Tímida. Indecisão. É-lhe muito difícil tomar uma decisão. Em regra, triste, com mau-humor e abatida. A música entristece-a, chegando a fazê-la chorar, o que a melhora substancialmente. Fica magoada por tudo. Desespera-se com facilidade. Não gosta de nenhum trabalho muito especialmente o de cariz intelectual. Memória fraca. Esqueceu-se do passado. Curiosidade: da infância retém algumas cantigas. Tem pesadelos. Pensa em demasia na morte. Preocupa-se com a sua salvação. Detalhista no vestir. Perfeccionista. Não suporta injustiças.

Sensação de teia de aranha na fronte.

Dores de cabeça quando acorda de manhã, com sensação de entorpecimento e náuseas, agravando à esquerda.

Dor no occipício, com sensação de aperto, que se estende ao pescoço e peito.

As pálpebras, em especial de manhã, estão inchadas e colam-se. Fotofobia. As suas margens estão inflamadas, com os bordos cobertos de escamas ou crostas.

Blefarite. Eczema das pálpebras, com erupção exsudativa e fissurada.

Tem erupções atrás dos ouvidos. Estas erupções são húmidas.

A audição é deficiente, o paciente ouve melhor no meio do barulho, quando há ruído. Ouve melhor num automóvel, no meio de ruídos surdos.

Eczemas que circundam a boca e os lábios.

Os lábios e as narinas estão doridos e gretados como pelo efeito do frio.

Vesículas queimantes na ponta e na parte inferior da língua.

Tem aversão aos doces e à carne, alimentos que lhe causam náuseas. Não gosta de bebidas quentes e os alimentos cozidos causam-lhe repugnância.

Flatulência gástrica aliviada por vômitos.

Dores de estômago ardentes, compressivas. Ardência do estômago derivada da fome.

O abdómen está distendido e o doente sente necessidade de desapertar as roupas.

Prisão de ventre crónica. As fezes são difíceis de expulsar por serem volumosas, grandes e duras e estão ligadas por filamentos viscosos.

Diarreia que ocorre normalmente após supressão de uma erupção, com fezes líquidas e escuras, de odor pútrido, misturadas com alimentos que não foram totalmente digeridos.

Tem dores picantes no ânus que agravam depois de cada evacuação. Pruridos que também agravam à noite. Hemorróidas ardentes.

Sensação de frio no corpo. É sensível às correntes de ar. Resfria-se com facilidade.

O nariz está vermelho e tem dores no seu interior, custando-lhe a assoar-se.

Anemia com vermelhidão da face.

Aversão ao coito nos dois sexos.

Fraqueza sexual devida a abusos, excessos sexuais.

Quando urina, esta é clara. Depois de algumas horas fica coberta de uma película que se torna turva deixando um depósito branco.

Eczema do escroto que apresenta erupções do tipo viscoso.

As regras atrasadas, são pouco abundantes, pálidas, muito curtas e acompanhadas de cólicas violentas. Retardam quando a doente molha os pés.

Vômitos matinais durante as regras, com fraqueza e prostração.

Por vezes, uma leucorreia abundante, esbranquiçada, viscosa e escoriante, substitui-as. Esta, agrava de manhã quando a doente se levanta.

Leucorreia antes e depois das regras, escoriante, provocando a irritação das coxas e pruridos. Prurido da vulva antes das regras.

Os mamilos estão doridos, fissurados. Cancro dos seios em cicatrizes antigas e abscessos de repetição. Cancro do útero.

A pele é doente. Qualquer ferida, mesmo pequena, supura. Crostas escamosas sob as quais escorre um líquido transparente como água, viscoso, pegajoso e espesso podendo apresentar-se amarelado, assemelhando-se ao mel claro.

Velhas cicatrizes abrem-se de novo.

Eczemas exsudantes: do couro cabeludo, das pálpebras, na parte de trás dos ouvidos, nos lábios, queixo, dobra de flexão dos membros superiores e inferiores, nos genitais, localizados entre as coxas, nádegas, dedos e tornozelos.

A pele das mãos é dura, gretada. As unhas doridas, são quebradiças, deformadas e espessas, crescendo grossas e disformes.

**AGRAVAÇÃO:** à noite, principalmente antes da meia noite; durante e após as regras; pelo calor da cama.

**MELHORA:** na obscuridade; cobrindo-se.

Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site, [www.homeoesp.org](http://www.homeoesp.org) - **Livros online » Matéria Médica dos Principais Medicamentos Homeopáticos**, os estudos de três homeopatas de renome, que qualificámos como o A, B, C da matéria médica homeopática:

- Allen, Henry Clay

Keynotes

- Boericke, William

Matéria Médica

- Clarke, John Henry

Dictionary of Practical Materia Medica