

RHUS TOXICODENDRON

Imerso em tristeza, ansioso, chora sem saber porquê.

Tem aversão a ficar em casa. Andar ao ar livre melhora consideravelmente o seu estado.

É um agitado. Agita-se dia e noite, mudando de posição e de lugar de modo a aliviar as dores que o atormentam. Não pode ficar muito tempo na mesma posição.

Apreensivo à noite. Tem medo de morrer envenenado. Não consegue ficar na cama.

Tem um sono pouco reparador. Sonha com grandes exercícios, com grandes esforços físicos, que executa duramente o seu trabalho de todos os dias.

Acorda encurvado.

Agitado. Não consegue permanecer na cama. Irritabilidade. Inquietude. Agitação durante o dia e à noite. Cansado da vida. Ideias suicidárias sem coragem de realização. Chora sem motivo. Fadiga. Esgotamento psíquico. Andar ao ar livre melhora-o. Medo da morte. Medo de ter uma doença grave ou incurável. Angústia. Memória deficiente.

Tem vertigens quando está de pé ou caminha.

Dores que melhoram pelo movimento e agravam pelo repouso.

Sente a cabeça pesada. Tem a impressão de estar embrutecido.
Rosto vermelho e inchado.

As pálpebras aglutinam-se, fecham-se, estão rígidas, paralisadas.

Herpes do lábio inferior e ao redor da boca.

Língua seca, dorida, coberta por uma camada esbranquiçada ou escura, com um triângulo vermelho na ponta e marcada dos dentes.

Garganta seca. Sede.

Inflamação das parótidas e das glândulas submaxilares.

Tem um gosto amargo na boca.

Deseja leite frio.

Diarreia aquosa, cor de tijolo.

Grande sensibilidade ao ar.

Tosse seca, durante um arrepio ou ao tirar as mãos para fora da roupa da cama.

Gripe com inflamação da garganta.

O escroto e a vulva estão inchados, avermelhados. Prurido dos genitais.

Reumatismo, torcicolo, lumbago.

Sensação de quebra na região lombossacra, com rigidez intensa, que agrava estando sentado e melhora pelo movimento contínuo.

Rigidez dolorosa dos membros, que agrava de manhã. Os primeiros movimentos aumentam a dor, mas a continuidade melhora; é como se o paciente se desenferrujasse.

Dores dilacerantes nos tendões que agravam pelo frio húmido.

A pele fica dorida no contacto com o ar frio.

Pele vermelha com erupções vesiculosas ardentes e pruriginosas. Eritema.

AGRAVAÇÃO: pelo tempo frio, húmido e chuvoso; depois de se ter molhado, em especial quando está suado; à noite, em especial por volta da meia noite; pelo repouso; estando deitado sobre o lado dorido.

MELHORA: no tempo quente e seco; pelo movimento, continuando a mover-se; mudando de posição; deitado numa esteira ou cama dura, no chão; pela massagem e fricção; por aplicações quentes.

Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site, www.homeoesp.org - **Livros online » Matéria Médica dos Principais Medicamentos Homeopáticos**, os estudos de três homeopatas de renome, que qualificámos como o A, B, C da matéria médica homeopática:

- Allen, Henry Clay

Keynotes

- Boericke, William

Matéria Médica

- Clarke, John Henry

Dictionary of Practical Materia Medica